



**TRIMEO<sup>®</sup>**



## **DEVIENS LE SUPER HÉROS DANS LE CHAMP !**

**Sûr et fiable** pour le contrôle des  
dicotylédones annuelles et pérennes en  
cultures céréalières



**CROP SOLUTIONS**








## AVANTAGES

- **La solution sûre et fiable de post émergence sûre contre les mauvaises herbes à larges feuilles\***.
- **Contrôle un large spectre de dicotylédones, particulièrement lorsqu'il est appliqué sur des adventices jeunes et en phase active de croissance.**
- **Efficace à très faibles doses / ha (20 grammes/hectare à l'automne et à 30 grammes/ha au printemps.)**
- **Grand spectre d'utilisation pour les céréales d'hiver de l'automne jusqu'au printemps.**
- **Flexibilité: pour désherbage de Autom (du stade 3 feuilles à la fin du tallage) et Printemps (du stade 3 feuilles au stade dernière feuille développée).**
- **TRIMEO® peut être utilisé sur toutes les variétés actuelles de blé tendre d'hiver et de blé dur d'hiver, d'orge de printemps et d'hiver, de seigle, de triticales et épeautre en bon état végétatif.**
- **Compatibilité exceptionnelle avec la plupart des herbicides Suivant l'expérience pratique, aussi miscible flexiblement avec AHL.**

\*à l'exception des espèces de gailllet-gratteron et de véronique voyageuse

## TABLEAU DES USAGES AUTORISÉS

### Traitement des parties aériennes

Cultures	Période et stades	Dose maximale
 Orge*	Désherbage de printemps: BBCH 13 - 39	30 g/ha
 Blé*	Désherbage de printemps: BBCH 20 - 39	30 g/ha
 Orge*	Désherbage de printemps : BBCH 20 - 39 Uniquement sur orge d'hiver	30 g/ha
 Seigle*	Désherbage de printemps: BBCH 20 - 39	30 g/ha
 Blé*	Désherbage d'automne BBCH 13 - 29	20 g/ha
 Orge*	Désherbage d'automne BBCH 13 - 29	20 g/ha
 Seigle*	Désherbage d'automne BBCH 13 - 29	20 g/ha

\*Appliquer sur des cultures en bon état végétatif Pour une efficacité maximale, appliquer sur des adventices jeunes et en pleine période de croissance. Max applications/ann 1.

**Désherbage d'automne**  
(BBCH 13 - 29), Dose maximale produit/ha 20g



Blé



Orge



Seigle

**Désherbage de printemps**  
BBCH 20 - 39; Dose maximale produit/ha 30g



Blé



Orge\*



Seigle

\*BBCH 13 - 39, BBCH 20 - 39 Uniquement sur Orge d'hiver

## COMPOSITION

Contient 750 g/kg de tribénuron-méthyl sous forme de granulés à disperser dans l'eau (WG).  
Autorisation de Mise sur le Marché n° 2140196.

## MODE D'ACTION

**TRIMEO®** est un herbicide qui agit principalement par voie foliaire, mais possède également une certaine activité racinaire. Il contrôle un large spectre de dicotylédones, particulièrement lorsqu'il est appliqué sur des adventices jeunes et en phase active de croissance. Il agit en bloquant, la synthèse de l'acétolactate synthase (ALS) dans les plantes sensibles, ce qui entraîne un arrêt immédiat de leur croissance et supprime ainsi toute compétition avec la culture (HRAC groupe 2 - précédemment B). Les plantes ainsi traitées disparaissent ensuite progressivement.

**TRIMEO®** doit uniquement être utilisé en suivant les recommandations mentionnées sur cette étiquette. Helm AG ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dégâts occasionnés par une utilisation non conforme à ses recommandations.